



Duocité B - Allée de la Mandallaz
74370 Metz-Tessy
France
Office: +33 (0)4 50 05 39 43
contact@b-ad.fr

Date: 07/07/2023

Operator: VA

ID Client: Cooper

B-ad Number: VE10625

B-ad Version: v4

Product Name: Eroxon IFU Nordics

Software: IND

Size: 300 x 416 mm

AW reference: KJ8JO-VE10625

Pharmacode: 1101 (28)

Number of Colors: 1

Countries:

NO
DK
FI
SE

Languages:

EN
NO
DK
FI
SE
EE
LV
LT

Process Colors:




PMS:

Tech. description:

Signature:

Date:

Last Name, First Name:



EN

These instructions for use contain important information for you.
Please read it carefully before using Eroxon®.

WHAT IS IN THESE INSTRUCTIONS FOR USE

- What Eroxon® is and what it is used for
- What you need to know before using Eroxon®
- How to use Eroxon®
- Possible side effects
- How to store Eroxon®
- Contents of the pack and other information

1. WHAT EROXON® IS AND WHAT IT IS USED FOR

Eroxon® is a clinically proven gel treatment for adult men (aged 18 years and over) with erectile dysfunction (also known as impotence). This is when a man cannot get or keep an erection hard enough for satisfactory sexual activity.

Eroxon® stimulates blood flow in the penis through a unique physical cooling then warming effect, helping you get and keep an erection hard enough for sex.

Eroxon® will only help you to get an erection if you are sexually excited (stimulated).

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE USING EROXON®

Do not use Eroxon® if:

- You are **allergic** to any of the ingredients (listed in section 6).
- You have been advised by your doctor to **avoid sexual activity**.
- You have any disease or **deformity of your penis** (such as Peyronie's Disease).
- The skin on your penis is **red or sore**, or appears **damaged or broken**.

Warnings and precautions:

Sexual activity can put extra strain on your heart. If you have a heart problem or think you might have a heart problem you should speak to your doctor.

It is important to have a check-up with your doctor as soon as possible within the first 6 months of using Eroxon® to ensure that your erection problems are not caused by another serious health condition.

Even if you feel healthy, your erection problems may be linked to other serious health conditions. Erectile dysfunction may be an early sign of:

- heart and blood vessel problems
- diabetes
- high blood pressure
- kidney disease
- multiple sclerosis
- high cholesterol
- liver disease or alcoholism

You should discuss your symptoms and these conditions with your doctor if you have not already done so.

Before using Eroxon® in order to ensure you are fit enough to have sex, tell your doctor if you:

- Get very breathless or feel any pain in the chest with light or moderate activity (e.g. walking briskly for 20 minutes or climbing two flights of stairs). Your doctor may need to check whether your heart can take the additional strain of having sex.
- Have ever had an erection that lasted more than 4 hours even without any physical or psychological stimulation (called priapism) or have any condition that can cause priapism. Conditions which can cause priapism include sickle cell anaemia (an abnormality of red blood cells), leukaemia (cancer of blood cells), or multiple myeloma (cancer of bone marrow).

Other important information:

- Eroxon® will only benefit you if you have problems getting or maintaining an erection.
- Erectile Dysfunction treatments may not work for everyone. Talk to your doctor about alternative treatment options if Eroxon® does not work for you.
- For most men, Eroxon® will work on their first or second attempt. If it has been sometime since you were able to get or keep an erection, it may take a few attempts before you achieve the desired effect.
- Eroxon® is not a contraceptive and contains no spermicidal ingredients. It does not protect against sexually transmitted infections (STIs).
- Eroxon® is only compatible with latex condoms.
- Eroxon® is not a lubricant. However it is safe to use Eroxon® with personal lubricants.
- You can improve your erectile function by making lifestyle changes; these include exercising regularly, reducing stress, giving up smoking and avoiding excessive alcohol use. If you are feeling depressed or anxious, talk to your doctor or pharmacist, who will be able to provide you with further advice.

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the country in which you are located.

3. HOW TO USE EROXON®

Eroxon® is supplied in a single dose tube.

When to use: Apply the gel just before sex.

How to open the tube: Unscrew the cap. Pierce the tube seal with the top of the cap. Squeeze tube firmly to empty all the contents which will provide the correct dose (approximately a pea-sized amount of gel).

How much to apply: Apply the contents of one tube to the **head of your penis** (a).

If you are uncircumcised, gently pull your foreskin back as far as comfortable before applying the gel.

How to apply: **Massage the gel onto the head of your penis for about 15 seconds.**

You can apply the gel yourself or your partner can apply the gel as part of foreplay.

Eroxon® will only help you get an erection if you are sexually aroused. You and your partner should engage in foreplay just as you would if you were not using a treatment for erectile dysfunction.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Rarely, using Eroxon® can cause skin irritation (feelings of burning, itching or soreness). Stop using Eroxon® if you or your partner experience any irritation. Speak to your doctor or pharmacist if the irritation persists.

5. HOW TO STORE EROXON®

Check the expiry date on the tube before use. The expiry date refers to the last day of that month. If the tube is damaged, do not use it. Throw the tube away and use a new one.

6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER INFORMATION

Eroxon® is available in packs of 4 single-dose tubes.

Ingredients: Aqua, ethanol (35%), propylene glycol, glycerine, carbomer, potassium hydroxide.

NO

Dette pakningsvedlegget inneholder informasjon som er viktig for deg.

Les det nøye før du bruker Eroxon®.

I DETTE PAKNINGSVEDLEGGET FINNER DU INFORMASJON OM:

- Hva Eroxon® er og hva det brukes mot
- Hva du må vite før du bruker Eroxon®
- Hvordan du bruker Eroxon®
- Mulige bivirkninger
- Hvordan du oppbevarer Eroxon®
- Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. HVA EROXON® ER OG HVA DET BRUKES MOT

Eroxon® er en klinisk dokumentert gel for behandling av menn (over 18 år) med erektil dysfunksjon (impotens). Dette er når en mann ikke kan få eller opprettholde en erekasjon som har nok til å ha tilfredsstillende seksuell aktivitet.

Eroxon® stimulerer blodgjennomstrømmingen i penis gjennom en unik fysisk kjølende og deretter en varmende effekt, som hjelper deg å få og beholde en erekasjon som er hard nok for sex.

Eroxon® vil bare gi deg erekasjon hvis du er seksuelt opphisset (stimulert).

2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER EROXON®

Ikke bruk Eroxon® dersom:

- Du er **allergisk** overfor noen av innholdsstoffene (listet i avsnitt 6)
- Du er blitt anbefalt av lege om ikke å **være seksuelt aktiv**
- Du har en sykdom eller en **deformert penis** (feks. Peyronies sykdom)

Huden på penis er **röd eller sär**, eller virker skadet eller **ödelagt**.

Advarsler og forsiktighetsregler:

Seksuell aktivitet kan gi ekstra påkjennung på hjertet. Snakk med legen din hvis du har hjerteproblemer eller tror at du kan ha et hjerteproblem.

Det er viktig å konsultere lege så snart som mulig innen de første 6 månedene med bruk av Eroxon® for å sikre at erektsjonsproblemete ikke er forårsaket av en annen alvorlig helsetilstand.

Selv om du føler deg frisk, kan erektsjonsproblemete være knyttet til andre alvorlige helsetilstander. Erektil dysfunksjon kan være et tidlig tegn på:

- hjerte- og kar sykdom
- høy blodtrykk
- diabetes
- høy kolesterol

- leverykdom eller alkoholisme
- nyresykdom
- Du bør diskutere disse symptomene og tilstanden med legen din, hvis du ikke allerede har gjort det.

- multippel sklerose

For du bruker Eroxon®, for å sikre at du er egnet til å ha sex, snakk med legen din hvis du:

- Blir svært anspusen eller opplever brystsmerten ved lett eller moderat aktivitet (f.eks. rask gang i 20 minutter eller gå opp til etasjer). Legen din må kanskje undersøke om hjertet ditt tåler den ekstra påkjenningen du utsettes for når du har sex.
- Har hatt en erekasjon som har var lengre enn 4 timer, selv uten fysisk eller psykologisk stimulering (priapisme) eller har en tilstand som kan gi priapisme. Noen tilstand kan øke sannsynligheten for priapisme, som sigdcellaneameti (unormale røde blodceller), leukemi (blodkreft) eller benmårgskreft.

Annen viktig informasjon

- Eroxon® vil bare være til nytte for deg hvis du har problemer med å få eller opprettholde en erektsjonsaktivitet.
- Behandlinger mot erektil dysfunksjon virker ikke for alle. Snakk med legen din om alternative behandlinger dersom Eroxon® ikke virker for deg.
- For de fleste menn vil Eroxon® fungere den første eller andre gangen man bruker det. Dersom det er en stund siden du klarte å få eller beholde en erekasjon, kan det hende at du trenger et par forsøk før du får ønsket effekt.
- Eroxon® er ikke et preventjonsmiddel og inneholder ikke spermidrepande midler. Den beskytter ikke mot seksuelt overførbare sykdommer.
- Eroxon® kan kun anvendes med latekskondom.
- Eroxon® er ikke et glidemiddel, men det er trygt å bruke Eroxon® sammen med glidemiddel.
- Din erektil funksjon kan **forbedres** ved livsstilsendringer; dette inkluderer regelmessig mosjon, reduserte stress, roypeslett og ved å unngå høy alkoholintak. Hvis du opplever nedstemhet og angst, snakk med lege eller apotek for videre veiledning.

Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med bruken av Eroxon® meldes til distributøren av Eroxon® og til nasjonale myndigheter.

3. HVORDAN DU BRUKER EROXON®

Når brukes Eroxon®. Påfør gelen like for sex.

Hvordan åpne tuben: Skru løs lokket på tuben. Stikk gjennom tubeåpningen med toppen av lokket. Klem tuben godt sammen for å tömme alt innholdet, som vil gi korrekt dose (ca. en mengde gel på størrelse med en ørt).

Hvor mye gel skal påføres: Påfør innholdet av en tube **på penishodet** (a). Hvis du ikke er omskåret, dra forsiktig forhuden tilbake så langt det føles behagelig for du påfører gelen.

Hvordan påføre: **Masser gelen på penishodet i ca. 15 sekunder.**

Du kan påføre gelen selv, eller partneren din kan gjøre dette som en del av et forsøk.

Eroxon® kan bare gi deg erekasjon dersom du er seksuelt opphisset. Du og partneren din bør starte med forsøk på samme måte som om du ikke brukte en behandling mot erektil dysfunksjon.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

I sjeldne tilfeller kan Eroxon® gi hudirritasjoner (svie, kløe eller sårhet). Stopp bruken av Eroxon® hvis du eller din partner opplever irritasjon. Snakk med lege eller apotek hvis irritasjonen fortsetter.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER EROXON®

Kontroller utløpsdatoen på tuben før bruk. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden. Hvis tuben er skadet må den ikke brukes. Kast tuben og bruk en ny.

6. INNHOLDDET I PAKKEN OG YTTERLIGERE INFORMASJON

Eroxon® leveres i pakke på 4 endose tuber.

Sammensetning: Vann, etanol (35%), propyleenglykol, glyserin, carbomer, kaliumhydroksid.

SE

Denna bipacksedel inneholder viktig informasjon för dig.

Läs nog i genom den innan du börjar använda Eroxon®.

I DENNA BIPACKSEDEL FINNER DU INFORMATION OM:

- Vad Eroxon® är och vad det används för
- Vad du behöver veta innan du använder Eroxon®
- Hur du använder Eroxon®
- Eventuella biverkningar med Eroxon®
- Hur Eroxon® ska förvaras
- Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD EROXON® ÄR OCH VAD DET ANVÄNDTS FÖR

Eroxon® är kliniskt bevisad gel för behandling av vuxna män (18 år och äldre) med erektil dysfunktion (impotens). Vilket betyder att en man inte kan få eller bibehålla en erektil tillräckligt hård för att genomföra samlagt/tillfredsställande sexuell aktivitet.

Eroxon® stimulerar blodflödet i penis genom en unik fysisk avkylning och sedan värmende effekt, som hjälper dig att få och upprätthålla en erektil tillräckligt hård för att kunna genomföra samlagt.

Eroxon® ger endast erektil tillräcklighet om du är sexuellt uppsett.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER EROXON®

Använd inte Eroxon om:

- Du är **allergisk** mot några av innehållsstoffen (se lista i avsnitt 6).
- Du har blivit rekommenderad av läkare att **avstå från sexuell aktivitet**.
- Du har en sykdom eller **deformerad penis** (såsom Peyronies sykdom)
- Huden på penis är **röd och irriterad** eller verkar skadad eller söndrig

Varningar och försiktighetsregler:

Sexuell aktivitet kan påverka hjärtat. Om du har problem med hjärtat eller tror att du kan få hjärtproblem ska du tala med din läkare.

Det är viktigt att konsultera läkare så snart som möjligt innan de första månaderna efter start av användning av Eroxon® för att säkerställa att dina erektila problem inte är orsakade av ett allvarligt hälsotillstånd.

Även om du känner dig frisk, kan dina erektila problem vara sammankopplade med andra allvarliga hälsoproblemer. Impotens kan vara ett tidigt tecken på:

- hjärt-kärlproblem
- diabetes
- högt blodtryck
- högt kolesterol
- leverykdom eller alkoholism
- njursykdom
- multipel skleros

Du bör diskutera dessa symptom och tillstånd med läkare om du inte redan gjort det.

För att säkerställa att du är i kondition att ha sex, tala om för läkare innan användning av Eroxon® om du:

- Blir väldigt andfådd eller känner smärta i bröstet under lätt eller moderat aktivitet (t ex rask gång i 20 minuter eller gå i trappor). Din läkare kan behöva kontrollera att ditt hjärtat klarar den extra påfrästningen med att ha sex.
- Har haft en erektil tillstånd som varat i mer än 4 timmar även utan fysisk eller psykologisk stimulering (kallat priapism) eller har haft något tillstånd som kan orsaka priapism. Tillstånd som kan orsaka priapism inkluderar sicklecellanemi (normalt röda blodkroppar), leukemi (blodkreft), eller multipel myelom (benmårgskreft).

Alla alvarliga händelser med denna produkt ska rapporteras till distributören och den nationella myndigheten.

Andre vigtige informationer:

- Eroxon® vil kun gavne dig, hvis du har problemer med at få eller vedligeholde en erekton.
- Behandler mod erektil dysfunction virker muligvis ikke for alle. Tal med din læge om alternative behandlingsmuligheder, hvis Eroxon® ikke virker for dig.
- For de fleste mænd vil Eroxon® virke på deres første eller andet forsøg. Hvis det er et stykke tid siden, du kunne få eller beholde en erekton, kan der gå et par forsøg, før du opnår den ønskede effekt.
- Eroxon® er ikke et præventionsmiddel og indeholder ingen sæddræbende ingredienser. Det beskytter ikke mod seksuelt overførte sygdomme (STI'er).
- Eroxon® er kun kompatibel med latexkondomer.
- Eroxon® er ikke et smøremiddel. Det er dog sikkert at bruge Eroxon® med personlige smøremidler.
- Du kan forbedre din erektil funktion ved at lave livsstilsændringer; disse omfatter regelmæssig motion, reducere stress, holde op med at ryge og undgå overdrevne alkoholforbrug. Hvis du føler dig deprimeret eller angst, så tal med din læge eller apotek, som vil være i stand til at give dig yderligere vejledning.
- Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med brug af Eroxon®, skal rapporteres til distributøren af Eroxon® og til de nationale myndigheder.

3. SÅDAN ANVENDER DU EROXON®

Eroxon® leveres i enkeltdosistuber.

Hvområ skal det påføres: Påfør gelen lige inden samleje.

Sådan åbnbar du tuben: Skru hætten af. Gennemhør rørforseglingen med toppen af hætten. Klem tuben godt sammen for at tømme alt indholdet, hvilket giver den korrekte dosis (ca. en mængde gel på størrelse med en ært).

Hvor meget skal du påføre: Påfør indholdet af en tube på glans (penishovedet) (a).

Hvis du ikke er omskåret, træk da forsigtigt forhuden tilbage så langt det er behageligt inden du påfører gelen.

Sådan påfører du gelen: Massér gelen på hovedet af din penis i ca. 15 sekunder.

Du kan selv påføre gelen, eller din partner kan påføre gelen som en del af forspillet.

Eroxon® hjælper dig kun med at få erekton, hvis du eller din partner oplever irritation. Tal med din læge eller apotek, hvis irritationen fortsætter.

4. MULIGE BIVRKNINGER

I sjældne tilfælde kan brug af Eroxon® forårsage hudirritation (fornemmelse af brændende, kløe eller ømhed). Stop med at bruge Eroxon®, hvis du eller din partner oplever irritation. Tal med din læge eller apotek, hvis irritationen fortsætter.

5. HVORDAN OPBEVARES EROXON®

Tjek udlobsdatoen på tuben før brug. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den 30°C pågældende måned. Hvis tuben er beskadiget, må den ikke anvendes. Smid tuben væk og brug en ny.

6. INDHOLD AF PAKKEN OG ANDRE OPLYSNINGER

Eroxon® fås i pakninger med 4 enkeltdosistuber.

Ingredienser: Vand, ethanol (35%), propylenglycol, glycerin, carbomer, kaliumhydroxid.

EE

Se kasutusjuhend sisaldb teile olulist teavet. Enne Eroxon®-i kasutamist luguge seda hoolikalt.

MIS ON SELLES KASUTUSJUHENDIS

1. Mis on Eroxon® ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Eroxon®-i kasutamist

3. Kuidas Eroxon®-i kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Eroxon®-i hoiustada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. MIS RAVIM ON EROXON® JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Eroxon® on kliniliselt töestatud geelravi erektsionihäiretega (tuntud ka kui impotentus) täiskasvanud meestele (18-aastased ja vanemad). Erektsionihäireks nimetatakse seda, kui mees ei suuda saavutada või säilitada erektsioni, mis on piisav rahuolavaks seksuaalvaherkorraaks.

Eroxon® stimuleerib verevoolu pereenises läbi ainulaadse füüsiliise jahutava ja seejärel soojendava efekti, aidates teil saavutada ja säilitada seksiks piisavalt tugevat erektsiooni.

Eroxon® aitab teil erektsionni saavutada ainult siis, kui olete seksuaalselt erutatud (stimuleeritud).

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE EROXON®-I KASUTAMIST

Ärge kasutage Eroxon®-i, kui:

• olete mõne koostisosaga (oletletud lõigus 6) suhtes **allergiline**;

• arst on soovitanud teil **valitda seksuaalset aktiivsust**;

• teil on mis peenisega seotud haigus või **deformatsioon** (nt Peyronie töobi);

• nahk teile peenisel on **punetav või valus või näib olevat kahjustatud või katki**.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Seksuaalne aktiivsus võib südamele lisakoomust tekitada. Kui teil on probleeme südamega või avrate, et teil võib olla probleeme südamega, pidage nõu oma arstiga.

On oluline, et teie arst kontrolliks teid võimalikult kiiresti esimese 6 kuu jooksul pärast Eroxon®-i kasutamise alustamist, et tagada, et teie erektsioniprobleemid ei oleks põhjustatud mõnest muutust täisest tervilikust seisundist.

Isegi kui tunnete end tervana, võivad teie erektsioniprobleemid olla seotud teiste täisest terveiselisunditega. Erektsionihäired võivad olla järgmiste probleemide varased liimingu:

• südame ja veresoonte probleemid • maksa haigus või alkoholism

• diabeet • neeruhaius

• kõrge vererõhk • hulgiskleroos

Arutage oma sümpomeid ja seisundi arstiga, kui te pole seda veel teinud.

Seksimiseks vajaliku vormi kontrollimiseks rääkige oma arstiga enne Eroxon®-i kasutamist, kui teil esineb järgmisi olukordi:

• tuugev öhupuudus või valu rinnus kerge või mõõduka aktiivusega (nt kirkondimine 20 minutit või trepist kahe korruse vörre üles lilkumine). Arst võib kontrollida, kas teie süda talub seksimise põhjustatud lisakoomust;

• teil on kunaži olnud erektsioon, mis kestis üle 4 tunni isege ilma füüsiliise või psühholoogilise stimulatsioonita (nimetatakse priapismiks), või teil on mõni seisund, mis võib põhjustada priapismi. Priapismi võivad põhjustada sirprakuline aneemia (punaste vereliblede anomaalia), leukeemia (vererakkude vähk) või hulgimüeloom (luuüdi vähk).

Muu oluline teave

• Eroxon® on teile kasulik ainult juhul, kui teil on probleeme erektsionni saamise või säilitamisega.

• Erektsionihäirete ravi ei pruugi kõigi puuhul töötada. Rääkige oma arstiga alternatiivsetest ravitõimulustest, kui Eroxon® ei sobi teile.

• Enamiku meeste jaoks töötab Eroxon® esimesel või teisel katsel. Kui erektsionni saavutamise või hoidmisse vältimiseks on mõödenud rohkem aega, võib soovitud efekti saavutamiseks kuluda paar katsel.

• Eroxon® ei ole rasestumisvastane vahend ja ei sisalda spermiciidseid koostisosid. See ei kaitse sugulisel teel levivate nakkuse eest.

• Eroxon® sobib kasutamiseks **ainult latekskondoomidega**.

• Eroxon® ei ole libesti. Eroxon®-i on ohut kasutada isiklike libestitega.

• Erektsionivõimet saab **parandada** elustili muutmisega, mis hõlmab regulaarsest treenimist, stressi vähendamist, suitsetamisest loobumist ja ligse alkoholitarbimise vältimeist. Kui tunnete depressiooni või ärevust, pidage nõu oma arsti või apteekriga, kes oskab teile anda edasini nõuandeid.

Kõikidest selle seadmega seotud tõsistest juhtumitest tuleb teatada tootjale ja teie asukohariigi pädevale asutusele.

3. KUIDAS EROXON® KASUTADA

Eroxon® tarvitakse ühanehnelises tuubis.

Millal kasutada Kandke geel nahale vahetult enne seksi.

Kuidas tuubi avada Keerake korki lahti. Läbistage tuubi lihend korgi ülaosaaga. Pigistage tuubi tugevalt, et tühjendada kogu sisu, mis annab õige annuse (ligikaudu hernesurune kogus geeli).

Kui palju nahale kanda Kandke ühe tuubi sisu **peenisepeale** (a).

Kui te pole ümberlõigatud, tõmmake eesnahk enne geeli pealekandmist õrnalt tagasi nii kaugele, kui on mugavalt võimalik.

Kuidas peal kanda Masseerige geeli peenisepeale umbes 15 sekundit.

Võite geeli ise peale kanda või teie partner võib geeli peale kanda osana eelmängust.

Eroxon® aitab teil erektsionni saavutada ainult siis, kui olete seksuaalselt erutatud. Teie ja teie partner peaksite tegelema eelmänguga samamoodi nagu siis, kui te ei kasuta erektsionihäirete ravi.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Harvadel juhtudel võib Eroxon®-i kasutamine põhjustada nahaärritust (pöletus-, sügelus- või valutunnet). Kui teie või teie partner tunnetate ärritust, lõpetage Eroxon®-i kasutamine. Ärrituse põhjus on pidevalt.

5. KUIDAS EROXON®-I HOIUSTADA

30°C Enne kasutamist kontrollige tuubil olevat köölklikusaega. Kööliklikusaeg viittab kuu viimasele päevale. Ärge kasutage tuubi, kui see on kahjustunud. Visake tuub ära ja kasutage uut.

6. PAKENDI SISU JA MUU TEAVE

Eroxon® on saadaval pakendites, mis sisälavad 4 ühanehnelist tuubi.

Koostisosad: vesi, etanol (35%), propyleenglükool, glütseriin, karbomer, kaliumhidroksidi.

LV
Šis lietošanas instrukcijas satur Jums svarīgu informāciju. Lūdzu, rūpīgi izlasiet to pirms Eroxon® lietošanas.

KAS IR ŠAJĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJĀ

1. Kas ir Eroxon® ja kādam nolūkam to lieto
2. Kas jāzina pirms Eroxon® lietošanas
3. Kā lietot Eroxon®
4. Iespējamās blakuspārādības
5. Kā uzglabāt Eroxon®
6. Iepakojuma saturs un cīta informācija

1. KAS EROXON® UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Eroxon® ir kliniski pierādīts ārstniecisks gēls pieaugušiem vīriešiem (no 18 gadu vecuma) ar erektilu disfunkciju (pazīstama arī kā impotence). Tas ir tad, kad vīrietis nevar sasniegāt vai saglabāt pietiekami stingru erekciiju apmierinošai seksuālai aktivitātei.

Eroxon® stimulē asins plūsmu dzimumloceklī, izmantojot unikālu fizisku dzesēšanu, kam seko sildsoo efekts, palidzot jums sasniegāt un saglabāt pietiekami stingru erekciiju.

Eroxon® palidzēs jums sasniegāt erekciju tād, kā esat seksuāli uzbuvināts (stimulēts).

2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS EROXON® LIETOŠANAS

Nelietojet Eroxon®, ja:

- Jums ir **alerģija pret** kādu (6. punktā minēto) sastāvdauji;
- Arsts Jums ir ieteicis **atturēties no** seksuālās aktiivitātēs.
- Jums ir jebkāda dzimumloceklī **slimība** vai **deformācija** (piemēram, Peironi slimība).
- Jūsu dzimumloceklī **āda** ir **sarkana** vai **sāpīga**, vai tā ir **bojāta** vai **plisusi**.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā:

Seksuālā aktiivitās var radīt papildu spriedzi jūsu sirdījā. Ja Jums ir sirds slimība vai domājat, ka Jums varētu būt sirds slimība, Jums jākonstatējas ar ārstu.

Ir svarīgi pēc iespējas ātrak veikt pārbaudi pie Eroxon® lietošanas, lai pārliecīnatos, ka jūsu erekcijs problēmas nav izraisījusi cīta nopietna veselības problēma.

Pat ja jūs jutjaties vesels, jūsu erekcijs problēmas var būt saistītas ar citām nopietnām veselības problēmām. Erektilā disfunkcija var agrīni liecināt par:

- sirds un asinsvadu problēmām;
- diabetu;
- augstu asinsspiedienu;
- augstu holesterīna līmeni;

Ja Jūs vēl neesat to izdarījis, Jums jāapspriežas ar ārstu par saviem simptomiem un šiem stāvokļiem.

Pirms Eroxon® lietošanas, lai pārliecīnatos, ka esat pietiekami vesels seksam, pastāstiet ārstam, ja:

- veicot visgaujais vai mērēnu aktiivitāti (piemēram, strauji staigājot 20 minūtes vai uzkāpjot pa diviem kāpņu posmiem), Jūs sajūtat stipru elpas trūkumu vai sāpes krūtis. Jūs arīstās iespējams būs jāpārbauda, vai Jūsu sirds var uzņemties papildu spriedzi, kas saistīta ar seksu;

• Jums kādreiz bijusi erekcijs, kas ilga vairāk nekā 4 stundas, pat bez jebkādas fiziskas vai psiholoģiskas stimulācijas (to sauva par priapismu), vai ir kāda slimība, kas var izraisīt priapismu. Slimības, kas var izraisīt priapismu, ir spīdīja sānu anēmija (sarkano asins sānu patoloģija), leikēmija (asins sānu vēzis) vai multiplā mieloma (kaulu smadzeņu vēzis).

Pirms Eroxon® lietošanas, lai pārliecīnatos, ka esat pietiekami vesels seksam, pastāstiet ārstam, ja:

- veicot visgaujais vai mērēnu aktiivitāti (piemēram, strauji staigājot 20 minūtes vai uzkāpjot pa diviem kāpņu posmiem), Jūs sajūtat stipru elpas trūkumu vai sāpes krūtis. Jūs arīstās iespēj